



DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA  
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN  
PUERTO MONTT

# PIMS

## **síndrome inflamatorio multisistémico.**

Informativo para padres y apoderados de nuestra comunidad educativa con el objetivo de prevenir y promocionar la salud de nuestro alumnado.


PROTOCOLO SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON SARS-COV-2.

*Comité de Seguridad y Sanidad.  
Colegio Inmaculada Concepción*

# Definición :



- El síndrome inflamatorio multisistémico se produce por una respuesta desorganizada al sistema inmunológico que provoca inflamación de varios órganos de nuestro cuerpo.
- Se presenta entre 4 a 6 semanas después de haber contraído covid – 19 ( o ser contacto estrecho).
- ¿Quiénes son el grupo de riesgo ?
- Población de 0 a 19 años, se ha visto mayor prevalencia en niños 7 a 10 años.



# Signos y síntomas

- Fiebre prolongada de 2 a 3 días .
- Rash cutáneo. (o pintitas rojas).
- Ojos rojo, conjuntivitis sin secreción.
- Boca roja, lengua aframbuesada.
- Tos.
- Edema en manos y pies ( inflamación ).
- Descamación dedos de las manos y pies.
- Malestar en general.
- Afectación Gastrointestinal (vómitos, diarrea o dolor abdominal).
- Síntomas neurológicos (cefalea, confusión, entre otros).
- Compromiso cardiovascular (hipotensión, miocarditis, shock).

## SINDROME INFLAMATORIO MULTISISTEMICO (SIM) ASOCIADO A COVID-19 ¿A qué debemos estar alerta?

### Definición:

Fiebre persistente, inflamación y disfunción multisistémica

Evidencia de infección COVID-19 (RPC, Serología, contacto estrecho)

Exclusión de otra causa demostrable y probable



# La importancia de consultar a tiempo



- Cuando el niño tuvo contagio de coronavirus o estuvo en contacto con estrecho con alguien que lo tuvo, hay que estar alerta a los síntomas entre cuatro a seis semanas después para consultar precozmente.
- *“Es muy necesario tomarles exámenes, ver si hay compromiso inflamatorio sistémico y tratarlos adecuadamente con el soporte que requiera cada uno”.*



# Cuidados

**Mantener medidas de precaución :**

- Distanciamiento social ( mayor a 1 metro )
- Uso de mascarilla de manera correcta.
- Lavado de manos recurrente.
- Uso de alcohol gel
- Evitar espacios concurridos.



**Distanciamiento social significa..**



Cuidarnos es tarea de todos...



